宍道湖における湖内流動と水質分布の変化

呉工業高等専門学校 正会員 黒川岳司 広島大学大学院工学研究科 フェロー会員 福岡捷二
 広島大学大学院工学研究科 学生員 三浦 心 広島大学大学院工学研究科 学生員 松下智美
 国土交通省出雲工事事務所 正会員 五道仁実

1. はじめに

著者らはこれまで、中海を代表水域として、汽水湖の流動・水質場が決定される機構を気象・海象・水文の外力条件との関係から明らかにしてきた。中海と連結する宍道湖もまた、水産資源に恵まれた我が国を代表する汽水湖である。二つの湖は、水位差に基づいて流出入が生じており、流動・水質場は相互に影響し合っている。しかし、海水の流入を受ける程度が異なるなどの理由から、両湖の水質環境の特徴は異なっている。そこで、本研究では宍道湖において流動・水質の現地観測を行い、宍道湖の湖内流動とそれに伴う水質分布の変化について検討した。

2. 現地観測

宍道湖は湖面積 80km² で、東西 16km、南北 6.2km の東西に長い矩形状である。湖盆は単純な盆状で、平均水深は 4.5m と浅い。宍道湖内において、St.S-1~S-4 (○印, St.S-2 が水深 6.1m で最も深い。) を設け、2000/9/26-10/25 の1ヶ月間、各点の上層 (水面下 1m) と下層 (湖底上 1m) で流向流速、塩分、水温、DO の固定点連続観測を行った。また、水質の鉛直分布の変化を追跡するために 4~8 日毎に各点で塩分、水温の鉛直分布を計測した。さらに 9/29-9/30 に、集中観測として LineA~C で ADCP による流況観測を行った。図-1 に観測点を示す。なお、湖心では気象、水位のモニター観測が行われている。

3. 結果および考察

(1) 観測期間中の気象・水文条件

図-2 に連続観測期間中の気圧、水位 (宍道湖、中海)、降雨量、東西軸風速、および St.S-2 での東西軸流速と各観測点での塩分、DO の経時変化を示す。期間中、定期的な降雨を伴ったが、大きな気象じょう乱はなかった。そのため、

図-1 観測点

図-2 連続観測期間中の気象・水文条件と流速、水質変化

キーワード：汽水湖、湖内流動、水質変化、密度躍層、DO
 〒737 広島県呉市阿賀南 2-2-11 Tel.0823-73-8481

宍道湖と中海の水位差が大きくなる
らず、大橋川での流出入は安定して
いたといえる。また、宍道湖では、
周辺地形の影響を受けて、東西軸の
風が卓越するが、この風は1日周期
で生じていることが確認できる。

(2) 湖内流動の特徴

連続観測期間の前半(～10/5)は、
比較的流速が大きい。後半は風速が
大きいにもかかわらず、流速は小さ
いことから、吹送流が主要因とは考
えにくい。これは、内部振動が生じ
たためと推測される。つまり、上層
と下層の流向が逆向きで、ほぼ1
日周期で流向が交代しており、また、
この時は上下層で塩分差が大きく、
完全な二層状態となっていること
から内部波が発生したと考えられ
る。このように、内部波が宍道湖の
湖内流動に大きな影響を与えてい
る。このような内部波は振動周期が
長いため、コリオリの影響から回転
性を持つことが考えられる。そこで、
連続観測期間の流向流速の分布を
調べると流向は東西ではなく、南西
-北東または南東-北西軸に傾い
ていることがわかる(図-3)。ADCP

図-3 連続観測期間中の流向流速の分布(上層)

図-4 ADCPによる流速ベクトルの平面分布(水面下2.2m)

図-5 St.S-2(水深6.1m)における塩分、水温の鉛直分布の変化

によって流れの平面分布を観測すると同様の結果が得られた(図-4)。以上のことから、宍道湖では恒常的に環流が生じていることが明らかである。

(3) 湖内の水質分布と湖内流動による水質変化

図-2において各点の塩分を比較すると、湖心付近のSt.S-2と大橋川側のSt.S-3ではほとんど差がない。降雨後に、斐伊川からの流入によって、斐伊川に近いSt.S-1の塩分だけ急激に低下するが、それも一時的で、おおよそ1日程度すると湖内全体でほぼ均一となる。また、DOは各点間の差は小さい。これらのことから、宍道湖湖内の水質の水平分布について、降雨後などに一時的に分布を持つが、先述の環流などによって一様になりやすいと考えられる。一方、水質の鉛直分布について検討する。図-5に最も深いSt.S-2における連続観測期間中の塩分、水温の変化を示す。湖底付近で高塩分となっている。また、図-2からSt.S-2において湖底上1mでも高塩分・貧酸素層の範囲に入らないことがある。したがって、宍道湖の鉛直分布について、成層しているものの、躍層位置は極めて湖底近くにあり、湖内の大部分が低塩分の水塊(上層水)として存在していると言える。

4. おわりに

宍道湖において、現地観測を行い、湖内流動と水質分布の特徴について検討した。その結果、環流が生じており、水質の水平分布は一様となりやすいことが明らかとなった。また、湖底付近に高塩分・貧酸素な薄い水塊が存在し、この下層の存在によって内部波が発生し、湖内流動にも影響を及ぼしていることが明らかになった。

参考文献:

1) 福岡捷二ほか: 中海における気象変化に伴う流れと貧酸素水塊の挙動, 土木学会論文集, No.636/VII-13, pp.61-79, 1999.