後で可燃ごみの分別方法に変更がなく、組成も大きく変化しなかった。B 地区では、可燃ごみに分類されていたプラスチックが資源ごみとなったが、広域化前後のプラスチック組成割合の減少はわずかであった。調査時期が分別方法変更から4ヶ月後であったため、家庭での分別の徹底が不十分であった可能性がある。今後精度を上げるために調査を継続する必要がある。

図2に、A地区、B地区の不燃ごみ組成の変化を示す。A地区では、広域化前後で容器包装プラスチック類を不燃ごみから資源ごみに変更したため、不燃ごみ中プラスチックが大きく減少し、家電製品やガラス類の割合が大きくなった。また、B地区は、広域化前後で不燃ごみの分別方法が変わっていないため、不燃性物質主体の組成は変わらなかった。C地区の広域化前の不燃ごみ組成調査は実施していないが、分別方法の変更はないため、組成の変更もなかったと思われる。

図3に、広域化前後の家庭系ごみ発生量および埋立物量の変化を示す。不燃ごみの発生量が広域化後に大幅に減少した。不燃ごみ発生量が大きく減少したのはA地区で、広域化前後で約80%減少した。これは、図2に示すように、不燃ごみ中プラスチックの減少が大きな原因と思われる。一方、資源ごみや可燃ごみの発生量の増加は、不燃ごみの減少量に比べて小さく、減少したプラスチックの排出先として説明できなかった。広域化前後でごみ発生量が減少していることも含め、今後の検討課題である。

埋立物量は、広域化前に比べ約半分の量となった。これは、不燃ごみが直接埋立されなくなったためである。一方、焼却処理によって発生する残渣量は、約50%減少した。今後、溶融スラグを資源利用することで、さらに埋立物量を削減することが期待される。

図2 A,B地区不燃ごみ組成変化

3.2 埋立物中有機汚濁性分の変化

図4に広域化前後の埋立物中可溶性TOC量を示す。可溶性TOCは、埋立地からの埋立地ガス発生や浸出水中有機汚濁成分の原因となる。広域化後は約95%の可溶性TOCが埋立地から削減された。広域化前は、埋立物中TOCのうち、A地区で埋立処分されていた不燃ごみ由来TOC量が、約70%を占めていた。広域化後には、これらが焼却処理あるいは資源ごみとして分別されることにより、埋立地へ搬入される可溶性TOC量が減少した。また、溶融処理を導入したことにより、焼却残渣溶融スラグ、溶融飛灰中可溶性TOCが減少したことも、埋立地全体の可溶性TOC削減に寄与した。

4. 結論と今後の課題

本研究では、家庭系ごみの広域化導入による変化を、ごみ組成、発生量、埋立物性状の面から明らかにした。ごみ処理広域化導入がどの程度循環型社会に貢献しているかを評価するためには、コスト面やエネルギー消費量の比較を行う必要があり、今後の課題である。

図3 広域化前後の家庭系ごみ発生量及び埋立物量変化

図4 広域化前後の埋立物中のTOC変化